

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada con abundante agua y jabón.
- No reensavar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Inorgánicos.**
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específicos. Se recomienda tratamiento sintomático.

- Teléfonos de emergencia: **ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428; SAMU: 106**

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes.
- Evitar la deriva por el viento.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco (05) metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA – ACARICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Azufre.....720g/L
 Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 034 - SENASA
 Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

Contenido Neto:

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

Nocivo en caso de ingestión
 Nocivo en contacto con la piel
 Nocivo si se inhala



ATENCIÓN



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: PANTERA 720 SC es un fungicida – acaricida protectante con acción por contacto y por vapor con propiedades protectoras y actividad multisitio. **Modo de aplicación:** Aplicar **PANTERA 720 SC** en aspersión previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. Llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua. Por ser una suspensión concentrada puede sedimentar el producto, lo cual no afecta a sus propiedades físico-químicas ni su acción, para ello se recomienda: **AGITAR VIGOROSAMENTE EL CONTENIDO TOTAL ANTES DE USAR.**

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD /PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMC (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	L/ha		
Papa	Acaro hialino	<i>Poliphagotarsonemus latus</i>	0.5-1	-	NA	NA
Frijol	Oidium	<i>Erysiphe poligoni</i>	0.5-1	-	NA	NA
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.5-1	-	NA	NA
Palto	Arañita roja	<i>Oligonychus peruvianus</i>	0.5 - 0.75	-	NA	NA
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	1	3 - 6	NA	NA
	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	1	-	NA	NA
Mango	Oidium	<i>Oidium mangiferae</i>	2	-	NA	NA
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1 - 1.5	-	NA	NA
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1	-	NA	NA
	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	1.5	-	NA	NA
Espárrago	Mancha de peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	-	3 - 5	NA	NA
	Roya del espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	-	4 - 5	NA	NA
Mandarina	Arañita roja de los cítricos	<i>Panonychus citri</i>	1 - 1.5	-	NA	NA
	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	1.5 - 2	-	NA	NA
Granado	Acaro hialino	<i>Poliphagotarsonemus latus</i>	1.5 - 2	-	NA	NA
Algodón	Oídiosis	<i>Erysiphe malachrae</i>	1	-	NA	NA
Café	Roya	<i>Hemileia vastatrix</i>	1.5 - 2	-	NA	NA
Banano	Trips	<i>Chaetanaphothrips signipennis</i>	1.5	-	NA	NA
Arroz	Acaro	<i>Stenotarsonemus spinki</i>	1.0 - 1.5	-	NA	NA
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	1.5 - 2	NA	NA
Arándano	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	-	1.5 - 2	NA	NA
	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	1.5	-	NA	NA
Limón Tahití	Acaro del tostado	<i>Phyllocoptura oleivora</i>	-	1 - 2	NA	NA

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresado en PPM NA: No aplica
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. Realizar rotación con productos de diferente modo de acción, dentro de un programa de MIP.
 - Se recomienda aplicar un máximo hasta 10 aplicaciones por campaña con un intervalo entre aplicación de 7 a 10 días. En cultivos de frijol, papa, pimiento, alcachofa, espárrago y arroz considerar dos campañas al año, mientras que para los demás cultivos considerar una campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO: El período de reingreso adecuado es de 24 horas después de la aplicación del producto. No permita animales en el área tratada.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo. No aplique aceites agrícolas durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

FITOTOXICIDAD: PANTERA 720 SC No es fitotóxico siempre y cuando se utilice en los cultivos y dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar los efectos de fitotoxicidad. No aplicar con temperaturas mayores a 30 °C.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 “LIGERAMENTE PELIGROSO”

