

SULFER X-80

INSECTICIDA
FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Ingrediente activo	Azufre 800 g/Kg
Aditivos	C.S.P. 1Kg
Grupo químico	Inorgánico
Formulación	Polvo Seco (DP)
Registro PQUA	N° 277 - SENASA
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso



Imagen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Acción fungicida, acaricida y repelente de insectos.
- Nutriente estructural de compuestos orgánicos en la planta.
- No ocasiona daños al cultivo ni a insectos beneficiosos.
- Registro orgánico.

APLICACIONES

El producto puede ser utilizado siguiendo las dosis recomendadas, sin embargo es preferible no aplicar cuando se presentan temperaturas ambientales mayores a 35 °C. De preferencia aplicar temprano en las mañanas o pasadas las altas temperaturas de la tarde. La efectividad del azufre alcanza su óptimo control entre 25 y 30 °C, asimismo es favorecida por condiciones de aire seco y ausencia de vientos.

CULTIVO	ENFERMEDAD / PLAGA		DOSIS kg/ha	PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común			
Arándano	<i>Thekopsora minima</i>	Blueberry leaf rust	35 - 50	NA	NA
Limón	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Ácaro del tostado	40 - 50	NA	NA
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	30	NA	NA
Mandarina	<i>Prodiptosis longifila</i>	Mosquilla de los brotes	30 - 40	NA	NA
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	70 - 80	NA	NA
	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Ácaro del tostado	70 - 80	NA	NA

SULFER X-80

INSECTICIDA
FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Vid	<i>Uncinula necator</i>	Oidium	18 - 27	NA	NA
Palto	<i>Oligonychus punicae</i>	Ácaro	70 - 80	NA	NA

PC: Periodo de Carencia

L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm.

NA: No aplica

Época y frecuencia de aplicación:

Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación del hongo o del ácaro para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones. Realizar un máximo de 3 aplicaciones/campaña/año. No aplicar en época de floración. No aplicar con temperaturas mayores a 30°C

PRESENTACIONES

15 Kg, 25 Kg y 50 Kg.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave

Mantener en lugares
secos y bajo techoNo comer, beber,
ni fumarMantener fuera del
alcance de niños y
animalesHacer uso de EPP
(Ver etiqueta)

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: 19/02/2026

Versión: 02